



ชื่อพื้นเมือง	เสลา
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Lagerstroemia loudonii</i> Teijsm. & Binn.
ชื่อวงศ์	LYTHRACEAE
ชื่ออื่น	เกวียบ ตะเกวียบ (ซอง-จันทบุรี), ตะแบกขน (นครราชสีมา), เสลาใบใหญ่ (ทั่วไป), อินทชิต
ลักษณะทั่วไป	<p>ไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่น ทึบสีเขียวเข้ม กิ่งมักย่อยห้อยลง เปลือกสีเทาดำ มีรอยแตกกระแหว่งเป็นทางยาวตลอดลำต้น</p> <p>ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม แผ่นใบยาวแบบรูปขอบขนานกว้าง 6-10 เซนติเมตร ยาว 16-24 เซนติเมตร ปลายใบแหลมเป็นติ่งยาวเล็กน้อย โคนมน ผิวใบมีขนปุยอ่อนนุ่ม ทั้ง 2 ด้าน</p> <p>ดอก ดอกออกเป็นช่อตามกิ่ง ดอกสีม่วงสดเวลาดอกบานช่อดอกจะแน่นเป็นรูปทรงกระบอกก้านช่อดอกและกลีบรองกลีบดอกมีขนนุ่ม สีเหลืองปกคลุมทั่วไป กลีบดอกมักมี 6, 7 หรือ 8 กลีบ ที่ผิวนอกของกลีบรองกลีบดอกรูปถ้วย เมื่อบานมีดอกขนาดกว้าง 6.8-8.2 เซนติเมตร กลีบดอกบางยับย่น</p> <p>ผล ผลเกือบกลมผิวแข็ง ยาวประมาณ 1.5-2.1 เซนติเมตร ผลแห้งแตกตามยาว 5 - 6 พู เมล็ดมีจำนวนมาก มีปีก</p>
การขยายพันธุ์	โดยใช้เมล็ด
การกระจายพันธุ์	เอเชียเขตร้อน ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ และป่าชายหาด พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก และภาคกลางลงมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาออกดอกเดือนมีนาคม - เมษายน ผลแก่ประมาณเดือนพฤศจิกายน เก็บเมล็ดเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์

ประโยชน์

ไม่ทำเครื่องแกะสลัก ด้ามเครื่องมือ ทำพื้น รอด ตง คาน ปลูกเป็นไม้ประดับ