



ชื่อพื้นเมือง	ปีบทอง
ชื่อสามัญ	Tree jamine
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Radermachera ignea</i> (Kurz) Steenis
ชื่อวงศ์	BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น	กาสะลองคำ ปีบทอง อ้อยช้าง จางจืด
ลักษณะทั่วไป	<p>ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง ผลัดใบ เรือนยอดแผ่เป็นชั้น ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทา แตกสะเก็ดเล็กน้อย มีช่องอากาศขนาดใหญ่ทั่วไป</p> <p>ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ยาว 20-60 เซนติเมตร ใบย่อย 3-5 คู่ ใบรูปรีแกมใบหอกหรือรูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 2 -5 เซนติเมตร ยาว 5 - 12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ แผ่นใบบาง หลังใบสีเขียวเป็นมัน</p> <p>ดอก ดอกสีเหลืองทอง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่งหรือลำต้น ช่อละ 3-10 ดอก ช่อยาว ดอกยาว 1-1.7 เซนติเมตร โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดคล้ายรูปกระสวยแกมรูปไข่ สีน้ำตาลแดง มีขนนุ่มทั่วไป โคนกลีบดอกเชื่อมเป็นรูปทรงกระบอกยาวปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานเต็มทีกว้าง 1.5-2 เซนติเมตร</p> <p>ผล ผลแห้งแตก ทรงกระบอกยาวเรียว 30-45 เซนติเมตร ผลแก่บิดเวียน และแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดแบนมีปีกแคบ มีจำนวนมาก</p>
การขยายพันธุ์	โดยเพาะเมล็ด
การกระจายพันธุ์	ถิ่นกำเนิด พบตามป่าดิบชื้นห้วย ที่ระดับความสูง 1,000 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ พุ่มใบสวย เหมาะที่จะปลูกเป็นจุดเด่นตามมุมของพื้นที่ ทางเดิน เพราะให้ดอกสวยงามตามกิ่ง ลำต้น ชอบอากาศเย็นและแห้ง