



ชื่อพื้นเมือง	คัดเค้าเครือ
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Oxyceros horridus</i> Lour.
ชื่อวงศ์	RUBIACEAE
ชื่ออื่น	คัดเค้าหนาม เค็ดเค้า พญาเท้าเอว หนามลิดเค้า
ลักษณะทั่วไป	ไม้พุ่มหรือไม้พุ่มรอเลื้อย ไม้ผลัดใบ บริเวณซอมีหนามโค้งแหลมเกิดเป็นคู่ๆ อยู่ตรงกันข้ามกัน เรือนยอดไม่เป็นระเบียบ กิ่งก้านหนาแน่นแตกตั้งฉากกันออกตรงข้าม อาจตัดแต่งรูปทรงได้ เปลือกนอกสีเทา มีรูระบายอากาศมาก แตกร่องตื้นๆ ตามยาวลำต้น เปลือกในสีขาว
ใบ	ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปใบกลมรีแกมขอบขนาน ขนาดกว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลมทู่ๆ โคนใบมนโค้ง เนื้อใบหนาเกลี้ยง เป็นมัน ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 0.5-0.8 เซนติเมตร เส้นแขนงใบย่อยไม่ชัดเจน
ดอก	เป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุกเชิงหลั่น ออกบริเวณซอกใบ กลีบรองดอกเป็นรูปถ้วยคล้ายลูกข่างรีๆ ส่วนปลายแยกเป็นอิสระ 5 กลีบ แต่ละกลีบปลายแหลม กลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวเมื่อแรกบาน แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อแก่ มีกลิ่นหอมแรง รูปกลีบรูปหอกหรือแกมขอบขนาน แต่ละกลีบ
ผล	ผลทรงกลมหรือรี ฉ่ำน้ำ ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงก้านผลมีผลเป็นวงกลมสีน้ำตาล มีเมล็ดจำนวน 1 เมล็ด
การขยายพันธุ์	นิยมเพาะกล้าจากเมล็ด หรือตอนกิ่ง
การกระจายพันธุ์	พบในป่าดงดิบชื้น ป่าโปร่งบริเวณภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก