



ชื่อพื้นเมือง

ตะแบกนา

ชื่อสามัญ

Bungor

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia floribunda Jack

ชื่อวงศ์

LYTHRACEAE

ชื่ออื่น

กระแบก ตราแบกปรี๋ ตะแบกไข่ บางอตะมะกอก บางอยามู เป็ยด็อง เป็ยนา เป็ยหางค่าง ตะแบกแดง แบก บางอยามูละเบะ ตะแบกน้ำ

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-30 เมตร ลำต้นเปลาตรง ส่วนโคนต้นเป็นพูพอน เปลือกนอกสีเทาหรือเทาอมขาว เป็นมัน มีรอยแผลเป็น เป็นหลุมตื้นๆ ตลอดลำต้น เปลือกในสีชมพู มีสีม่วงใต้เปลือกใน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งใหญ่ที่แตกจากลำต้นมักชูกิ่งขึ้นข้างบน

ใบ ใบเดี่ยวติดตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยไม่แน่นอน ทรงใบรูปขอบขนานและรูปหอก กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร เนื้อใบหนา ตัวใบมักจะม้วนขอบทั้งสองข้างขึ้นข้างบน ใบอ่อนออกสีแดง และมีขนสั้นๆ อ่อนนุ่มปกคลุม ใบแก่สีเขียวเข้ม จะเกลี้ยงหรือเหลือขนเพียงประปราย

ดอก ดอกออกรวมกันเป็นช่อกระจุกแยกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อมักกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ดอกบานเต็มที่ กว้าง 3-3.5 เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบ เป็นแผ่นกลมและมีก้านสั้นๆ ทำให้ดูช่ออัดแน่นมาก กลีบดอกยับย่น สีม่วงปนชมพูหรือสีกุหลาบ กลีบดอกแก่จะสีขาว

ผล ผลแห้งรูปรีๆ ยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร มีขนคลุมประปราย ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลดำ

จะแตกทางด้านบนเป็น 6 แฉก เมล็ดเล็กมีปีกโค้งๆ ทางด้านบน

การขยายพันธุ์

นิยมใช้เพาะด้วยเมล็ด

การกระจายพันธุ์

พบขึ้นประปรายในป่าเบญจพรรณค่อนข้างขึ้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ขึ้นอยู่มากในป่าดงดิบ ป่าน้ำท่วม และตามท้องนาทั่วทุกภาคของประเทศไทย ที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 20-300 เมตร