



ชื่อพื้นเมือง	เต่าร้างแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Caryota mitis</i> Lour.
ชื่อวงศ์	PALMAE
ชื่ออื่น	เชื่องหมู เต่าร้างมีหน่อ เต่าร้างแดง มะเต็ง
ลักษณะทั่วไป	ปาล์มต้น แตกหน่อเป็นกอใหญ่แต่ละต้นสูง 5-10 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 5-15 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวเทา <i>ใบ</i> ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเวียนสลับ กว้าง 1-1.50 เมตร ยาว 1.50-2.70 เมตร ใบย่อยเป็นรูปพัด กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร ปลายใบจักเว้าแหว่งไม่เป็นระเบียบ และมีลักษณะไม่แน่นอน โคนใบสอบเป็นรูปลิ้ม เบี้ยว <i>ดอก</i> ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ตามด้านข้างของลำต้น ดอกมีขนาดเล็ก ดอก สีขาวครีม ช่อดอกตัวผู้เกิดสลับกับช่อดอกตัวเมียในต้นเดียวกัน ขนาดยาว 25-50 เซนติเมตร ดอกตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าดอกตัวเมียมาก กลีบรองฐานดอกมาก แต่ละกลีบเป็นรูปขอบขนาน และเรียงเคียงกัน เกสรตัวผู้ มี 15- <i>ผล</i> ผลสดค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ผลแก่ เมื่อสุกสีแดงคล้ำถึงดำ จำนวนเมล็ดมาก
การขยายพันธุ์	นิยมเพาะด้วยเมล็ด
การกระจายพันธุ์	พบตามป่าดงดิบชื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,500 เมตร และพบในป่าพรุทางภาคใต้
ประโยชน์	ราก, หัว รสหวานเย็นขม ดับพิษดับปอด แก้กาฬขึ้นปอด แก้หัวใจพิการ แก้ม้ามพิการ แก้ตับทรุด แก้ไข้ใน

