



ชื่อพื้นเมือง	เอื้องหมายนา
ชื่อสามัญ	Crap ginger, Malay ginger, Spiral flag
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Costus speciosus</i> (Koen.) Smith.
ชื่อวงศ์	COSTACEAE
ชื่ออื่น	เอื้องต้น (ยะลา) เอื้องใหญ่ (ภาคใต้) ชูไลบ้อง ชูเลโบ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกลางเกาะสมุย) เอื้องช้าง (นครศรีธรรมราช) จุยเจียวฮวย (จีน)
ลักษณะทั่วไป	ไม้เนื้ออ่อน มีเหง้าใต้ดิน ออกเป็นกอแน่น สูง 1-3 เมตร กาบใบปิด โอบรอบลำต้น สีแดง หรือน้ำตาลแดง มีประสีเขียว
ใบ	ใบกว้าง 3-10 เซนติเมตร ยาว 12-25 เซนติเมตร ใบรูปรี รูปใบหอกปลายใบแหลม โคนใบมน ด้านหลังใบเลี้ยงหรือมีขน ด้านท้องใบมีขนนุ่มสีเงินเป็นมันคล้ายเส้นไหม
ดอก	ช่อดอกออกที่ปลายลำต้น รูปไข่ ยาว 8-12 เซนติเมตร กาบรองดอกรูปไข่ปลายแหลม ปลายแข็งคล้ายหนาม สีเขียวปนแดง ยาว 1.5-4.5 เซนติเมตร แต่ละกาบรองรับดอกย่อย 1 ดอก ดอกทยอยบานครั้งละ 1-2 ดอก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด และเป็นสัน 3 สัน ปลายแยกเป็น 3 กลีบ แยกเป็น 2
ผล	ผลรูปไข่ ยาว 1-2.5 เซนติเมตร สีแดงสด เมล็ดสีดำ
การขยายพันธุ์	โดยการเพาะเมล็ด
การกระจายพันธุ์	มักพบขึ้นตามบริเวณที่มีความชุ่มชื้น ใต้ต้นไม้ใหญ่ ตามบริเวณเชิงเขา ตามน้ำตก และริมทางน้ำ

ประโยชน์

สรรพคุณ : เหง้า ใช้แห้งประมาณ 3-6 กรัม ใช้ต้มน้ำกิน หรือตุ๋นกับเนื้อสัตว์กิน ใช้สำหรับ
ภายนอก ต้มเอาแต่น้ำชะล้าง หรือตำพอก เหง้าจะมีรสขม และเย็นจัด แต่มีพิษ ใช้เป็นยา
ขับปัสสาวะ รักษาอาการบวม น้ำ สตรีตกขาวและโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ แผล
อักเสบบวมมีหนอง