



ชื่อพื้นเมือง	ขี้มอด
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f. var <i>lakhonensis</i> (Gagnep.) Hong Ho & Niyomd.
ชื่อวงศ์	LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ชื่ออื่น	กระพี้หยวก กะปิ ถ่อน อีเม็ง
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ลำต้นแตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม โปร่ง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว เรียงเวียนสลับ ใบย่อยเรียงสลับ ใบรูปรี หรือรูปไข่ ปลายมนหรือเว้าหักเล็กน้อย ขอบใบเรียบ
ดอก	ดอกสีชมพูอมม่วง ออกเป็นช่อแตกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง
ผล	ผลเป็นฝักแบนสีเขียว รูปรี โคนและปลายสอบแหลม มีเมล็ดนูน 1-2 เมล็ด
การกระจายพันธุ์	พบบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของไทย ขึ้นในป่าเบญจ พรรณ และชายป่าดิบแล้ง ระดับความสูง 50-60 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-เมษายน ออกผลเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม