



Calathea bella



Calathea crotalifera



Calathea gandersii

ชื่อพื้นเมือง	คล้า
ชื่อสามัญ	Calathea
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Calathea</i> spp.
ชื่อวงศ์	MARANTACEAE
ชื่ออื่น	ก้านพร้าว (ภาคกลาง) คล้า (ภาคกลาง, นครศรีธรรมราช) บูแมจี้จ๊ะไอย์ (มลายู-ปัตตานี) เบอรัมแม (มลายู-นราธิวาส) แหย่ง (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป	คล้าจัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีเนื้ออ่อน เจริญเติบโตเป็นกอหรือพุ่ม มีอายุหลายปี ลำต้นมีทั้งตั้งตรงและเลื้อย มีเหง้า (rhizome) หรือหัว (tuberous) ใต้ดินแตกหน่อได้ ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร
ใบ	เป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน มักมีลวดลายและสีสลับบนใบสวยงาม สีสลับและลักษณะใบจะแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ โคนต้นมีกาบใบหุ้ม ลักษณะประจำพืชวงศ์นี้คือ แผ่นใบสองด้านของเส้นกลางใบไม่เท่ากัน ขณะใบยังอ่อนด้านใหญ่จะม้วนหุ้มด้านเล็กไว้ นอกจากนี้ตรงรอยต่อของก้านใบกับแผ่นใบจะโป่งออก (pulvinate) มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของใบ เวลากลางวันใบคล้าจะกางออก และจะห่อขึ้นในเวลากลางคืน คล้ายกับการพนมมือ จึงมีผู้เรียกชื่อพืชวงศ์นี้ว่า " Player Plants"
ดอก	ดอก ออกเป็นช่อบริเวณยอดอ่อนจากซอกกาบใบ ดอกจะออกเป็นช่อบริเวณยอดอ่อนจากซอกกาบใบ ดอกจะออกเป็นคู่จากกาบรองดอกที่เรียงซ้อนกันเป็นแถวในระนาบเดียวกัน สลับซ้ายขวาจากแกนช่อดอก (distichous) หรืออาจจะเรียงสลับกันเป็นวง (spiral) ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก แต่สมบูรณ์เพียง 1 อัน ส่วนที่เหลือเป็นหมันจะเปลี่ยนรูปไปคล้ายกลีบดอก 1 กลีบ ลักษณะของช่อดอกมี 4 แบบ คือ แบบช่อกระจุกอยู่ปลายก้าน แบบช่อแขนง แบบช่อกระจุก และแบบช่อเชิงลด
ผล	ผล ซึ่งไม่ค่อยจะพบนักมี 2 ลักษณะ คือ ผลแห้ง เมื่อแก่อาจจะแตกหรือไม่แตกออก และผลที่มีเนื้อนุ่ม และมีเมล็ด 1-3 เมล็ด

การขยายพันธุ์

โดยแยกหน่อ หรือแยกเหง้า

การกระจายพันธุ์

คล้ายเป็นพืชที่พบในเขตร้อน เช่น อเมริกาใต้ ดินที่ปลูกต้องมีการระบายน้ำดี และได้รับน้ำเพียงพอ เหมาะกับสภาพดินปนทราย

ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ